

303

AD QVODLIBETARIAM  
QVAESTIO MEDICA,  
MATVTINIS EXCVTIENDA DISPVTATIONI-  
BVS. IN SCHOLIS MEDICORVM DIE IOVIS III. FEBRVARII  
M. CLAVDIO FAVVELETIO PRÆCENTORE SENONENSI  
DOCTORE MEDICO MODERATORE.

*An omni hepatico fluxus stringentia?*



EPATIS temperiem debita qualitatum *συμμετρεῖται* importat, vnde omnes ad *αἰματώσων* actiones debita: *αἰματώσων* verò primaria & propria visceris, vel consentientium, illi partium imbecillitate, parentem inilitatam excretionum. E quibus spontaneæ plures, *κρίσεις*, quotquot salu- tares; & ex morbo infesta non pauca efficiuntur *δυσεντερίαι* ciborum emersione non deteriores. Illas nusquam, has verò ad initia restringere haud decet: Immo nec in progressu, dum obstructionem prius curandam agnoscunt.



LLVC spectant mutilatorum, ad vitam molliorem reuocatum, hæmorrhoidum, & muliebrum suppressorum, etiam post septem annos ad naturam reditura: per sedem *ἐκκρίσις*, puri fecis sanguinis, licet *ἀσθῆναι* manantis, non sistendæ. Istuc morà acris, fœtidi nigri vilitur per ima hepatis expultrice decliuēs, quibus pestilenciales aut acuti morbi hydropis fortī superueniente diarrhœa non exitiosi efficaces iudicantur. Huc autem hepatisformes, *σπληνίτις*, fœtidæ putrefactionis soboles, & aquæ *ἀσθῆναι*.



VI atrabilaria in ægri perniciem visenda, melancholica, biliosa, chylosa, aliter que aliter adscribuntur. Verum & obstructionis astringentibus in- pugnabilis assecle, haud quaquam separabiles sunt quin aut tumorum *σπληνίτις*, excepto œdemate, vt erysipelas vel phlegmonem indecenti astrin- gentium vsu in scirrhum medico insolubilem degeneres, vel ipsum, vt tumorem crassum, lentum, aut viscidum dictæ obstructionis seminariū sum- moueris. Non ex arte summouendum ei, quem forma & situs visceris regit.



SIAM enim ventriculo, lactibus, intestinis, lieni, non tamen omnibus affectibus consentientem occupanti (quod chyli vitio *αἰμα- τώσων* non emendado, vt nec huius *δυσεντερίαι* sepius euenit) rema secta nullum obstructioni præsidium: sed vt spleni ab *ἐκκρίσει*, qua- lis securidaca, chelydoniū maius, pentaphyllon, tormētilla philix mas, beronica, agtrimonia: Ac purgantibus trahendo remediis, vt agar- co, ad pituitam: Epithymo, senna, polypodio ad melancholicam bilem, rhubarbaro: alioquin hepati iniquo. Item citatis, melius hirudi- ne, quàm scalpello, aut ex capta cataplasmate hæmorrhoidibus, suo fluxu aut retentione immoderata, hepatis non innoxij hydropem, vel phthisin, fluxu lethalem inducentibus.



ONVEXÆ autem partis manifeste, spirandi difficultate. Ex motu, ambulatione dolentis pulmonis hepatis: vt pulmoni inflammato hepar compati- tur per fluxum non periculose superuenientem. Hypochondrij duritiam antea septimum diem febris, non infesta ictero hepatis modo, modo lienis, modo vtriusque simul, ac venenatorum noxæ sequaci. Tum *σπληνίτις* in hypochondrio, auctore doloris, quem febris superueniens elidit: *δυσεντερίαι* τε καὶ *λῆθρον* *σπληνίτις* auxilia discutiunt obstructionem per vias vrinæ: vnde cruenta, nigra, sanguinea, fœtida, biliosa, *δυσεντερίαι*, vna eadēque securitati & exitio frequentatur.

*Non ergo omni hepatico fluxus stringentia.*

Proponebat IOANNES PERRINVS DE PERRINIS TVILENSIS LOTHARENÆ: Anno 1600.

DOMINI DOCTORES DISPVTATVRI.

M. Germanus Clerfeliier.  
M. Robertus le Secq.  
M. Richardus Marces.

M. Hieronymus Tiquet.  
M. Symon Barzin.  
M. Claudius Etyon.

M. Egidius Heron.  
M. Ioannes Beauchefne.  
M. Ioannes Riolan.